

الأسئلة الأكثر
تداولاً عن لقاح
**Pfizer-BioNTech
COVID-19 Vaccine.**



ماذا عليّ أن أفعل بخصوص الآثار الجانبية؟

إذا عانيت من أي آثار جانبية، فاتصل على الخط الساخن للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية على الرقم ٦٢٤٥. أو اتصل بمقدم التطعيم أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي آثار جانبية تزعجك أو لم تختفي بعد ٨ ساعة من حصولك على اللقاح.

هل يمكنني الحصول على لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 مع لقاحات أخرى؟

لا توجد معلومات حول استخدام لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 مع غيره من اللقاحات.

ماذا لو كنت حاملاً أو تقومين بالرضاعة الطبيعية؟

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، ناقشي خياراتك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

هل يمكن أن يؤدي إعطاء لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 إلى الإصابة بـ COVID-19؟

كلا، لا يحتوي لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 على فيروس SARS-CoV-2 ولا يمكنه أن يؤدي إلى إصابتكم بـ COVID-19.

احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك

عندما تحصل على جرعتك الأولى، ستحصل على بطاقة تطعيم وتُعطى موعد للعودة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19. تذكر إحضار بطاقتك معك إلى الموعد.

من الذي عليه أن يحصل على لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19؟

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) باستخدام الطارئ للقاح
Pfizer-BioNTech COVID-19 للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا
وما فوق.

من الذي لا يجب أن يحصل على لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19؟

لا يجب أن تحصل على لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 إذا:

• أصبت بردّ فعل تحسّسي شديد بعد جرعة سابقة من هذا اللقاح.
• كان لديك ردّ فعل تحسّسي شديد تجاه أي من مكونات هذا اللقاح.

إذا تلقيت جرعة واحدة من لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19، فيجب أن
تتلقى جرعة ثانية من نفس اللقاح بعد 3 أسابيع لإكمال سلسلة التطعيم.

ما هي الآثار الجانبية للقاح Pfizer-BioNTech COVID-19؟

تشمل الآثار الجانبية التي تمّ الإبلاغ عنها جزاء استخدام لقاح
Pfizer-BioNTech COVID-19 ما يلي:

- ألم في موقع الحقن
- التعب
- صداع في الرأس
- ألم عضليّ
- قشعريرة
- ألم في المفاصل
- حمّى
- انتفاخ موقع الحقن
- احمرار موقع الحقن
- غثيان
- الشعور بتوتّع
- تضخم الغدد/العقد الليمفاويّة

هناك احتمال بسيط أن يتسبّب لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 في
حدوث تفاعل تحسّسي شديد. عادةً ما يحدث ردّ فعل تحسّسي شديد في
غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة من لقاح
Pfizer-BioNTech COVID-19. لهذا السبب، قد يطلب منك موفر التطعيم
البقاء في المكان الذي تلقيت فيه لقاحك للمراقبة بعد التطعيم. يمكن أن
تشمل علامات رد الفعل التحسّسي الشديد ما يلي:

- صعوبة في التنفّس
- تورّم في الوجه والحنك
- تسرّع ضربات القلب
- ظهور طفح جلديّ شديد في جميع أنحاء الجسم
- الدوخة والضعف الجسديّ

ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل أن تحصل على هذا اللقاح؟

لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 هو لقاح قد يمنعك من الإصابة
بـ COVID-19.
لا يوجد لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) للوقاية الكاملة
من COVID-19.

يتمّ إعطاء لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 كسلسلة مؤلّفة من جرعتين،
بفاصل 3 أسابيع بينهما، عبر حقنة في العضل.
قد لا يحمي لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19 الجميع.

ما هو مرض COVID-19؟

يحدث مرض COVID-19 بسبب فيروس كورونا المستجد الذي يسمّى
SARS-CoV-2. علماً أنّه لم يتمّ تشخيص هذا النوع من فيروس كورونا
قبل. يمكنك أن تصاب بـ COVID-19 عند التواصل بشخص آخر مصاب
بالفيروس. وهو في الغالب مرض تنفسيّ يمكن أن يؤثّر على أعضاء أخرى.
يعاني الأشخاص المصابون بـ COVID-19 من مجموعة واسعة من الأعراض
المعروفة حتى الآن، تتراوح بين الأعراض الخفيفة وقد تصل إلى المرض
الشديد. قد تظهر الأعراض بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرّض للفيروس.
قد تشمل الأعراض ما يلي:

- حمى أو قشعريرة
- سعال
- ضيق في التنفّس
- الإرهاق
- آلام العضلات أو الجسم
- صداع في الرأس
- فقدان لحاشية الذوق أو الشمّ
- التهاب الحلق، احتقان أو سيلان الأنف
- الغثيان أو القيء

ما الذي يجب أن تذكره للممرض/ الطبيب، قبل أن تحصل على لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19؟

أخبر للممرض(ة)/ الطبيب عن تاريخك الطبيّ بالكامل، بما في ذلك إذا:

- كان لديك أيّ حساسيّة
- كان لديك حمّى
- كنت تعاني من اضطراب في السيلان أو تأخذ مسيلّ للدم
- كنت تعاني من نقص المناعة أو تأخذ دواء يؤثّر على جهاز المناعة لديك
- كنت حامل أو تخططين للحمل
- كنت تقومين بالرضاعة الطبيعية
- كنت تلقيت لقاحًا آخر لـ COVID-19